

Samenvatting richtlijn: Hantavirusinfectie

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	Griepaal syndroom en nier- of leverproblemen.
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> > Serologie: IgM of significante titerstijging van IgG-antistoffen is bewijzend voor een infectie in het acute stadium. > PCR. Referentielabo: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_lab/hantavirus/default.aspx
Incubatieperiode	Enkele dagen tot twee jaar, maar meestal twee tot drie weken.
Besmettelijke periode	Niet van toepassing. Knaagdieren kunnen maandenlang drager zijn.
Reservoir	Knaagdieren.
Besmettingsweg	Inhalatie van aerosolen van feces en urine van besmette knaagdieren.
Risicogroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Mensen die in bosrijke gebieden werken (landbouwers en boswachters). > Laboratoriummedewerkers die met knaagdieren werken. > Medewerkers van plaagdierenbestrijdingsdiensten en dierentuinen, militairen, dierenhandelaren en veevervoerders. > Kampeerders (contact besmette knaagdieren en/of besmette excreta).
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	Zinvol bij een bewezen humaan geval, met name bij besmetting binnenshuis. Reiniging van de ruimte kan voorkomen dat anderen ziek worden.
2. Contactopsporing	Niet van toepassing.
3. (Chemo)profylaxe	Er bestaat geen profylactische medicatie.
4. Wering	Niet van toepassing.
Meldingsplichtig	Neen.