

Samenvatting richtlijn: Listeriosis

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	<ul style="list-style-type: none"> > Vaak asymptomatisch tot mild met griepachtige verschijnselen. > Bij ernstig verloop: encefalitis, soms bot- en gewrichtsinfecties. > Verhoogde kans op ernstig beloop: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zwangere vrouwen (risico voor zwangere vrouw, voor het ongeboren kind en de pasgeborene) ○ Immuungecompromitteerden ○ Ouderen ○ Personen met ernstig onderliggend lijden. ○ Personen die maagzuurremmers gebruiken.
Diagnose	Kweek (bloed, lumbaal vocht, vruchtwater, meconium).
Incubatieperiode	Verschilt per klinische vorm: <ul style="list-style-type: none"> > Gastro-enteritis 24 uur (6-240 uur). > Bacteriëmie 2 dagen (1-12 dagen). > Invasieve listeriose 8 dagen (1-67 dagen). > Infectie van centraal zenuwstelsel 9 dagen (1-14 dagen). > Infectie tijdens zwangerschap 27 dagen (17-67 dagen, maar kort bij bacteriëmie tijdens zwangerschap).
Besmettelijke periode	Tot maanden na ziekte of asymptomatische infectie in ontlasting.
Reservoir	Huis- en wilde dieren, grond, water en vegetatie.
Besmettingsweg	<ul style="list-style-type: none"> > Indirect contact (voedsel). > Direct contact met een dier of het milieu. > Verticale transmissie moeder naar kind.
Risicogroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Zwangere vrouwen, foetussen, neonaten, ouderen en cellulair immuungecompromitteerden. > Personen die bij hun werkzaamheden direct of indirect contact hebben met <i>L. monocytogenes</i> bv via besmet materiaal zoals ontlasting of besmette grond, in laboratoria, geïnfecteerde dieren.
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	Enkel bij clusters: voedingsanamnese en navragen van contacten met dieren.
2. Contactopsporing	Bij bevestigde bron: personen (in het bijzonder zwangere vrouwen) die mogelijk zelfde voedsel hebben gegeten.
3. (Chemo)profylaxe	Niet van toepassing.
4. Wering	Niet van toepassing.
Meldingsplichtig	Nee.