

Samenvatting richtlijn: Psittacose

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	<ul style="list-style-type: none"> > Symptoomloos tot griepachtig en septisch ziektebeeld. > Pneumonie (interstitieel of lobair) meest bekende vorm.
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> > Bij voorkeur PCR: sputum of BAL. > Serologie: 2 serummonsters met interval van 2 weken. > Kweek: erg specifiek maar niet sensitief.
Incubatieperiode	1 tot 4 weken.
Besmettelijke periode	<ul style="list-style-type: none"> > Vogels scheiden <i>C. psittaci</i> jaren intermitterend uit. > Besmet materiaal kan minstens 8 maanden infectieus blijven.
Reservoir	Vrijwel alle vogels.
Besmettingsweg	Inhalatie opgedroogde excreta van geïnfecteerde vogels.
Risicogroepen	Mensen die beroepshalve of via hobby in nauw contact komen met vogels.
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	Contact met (uitwerpselen van) vogels.
2. Contactopsporing	<ul style="list-style-type: none"> > Dierlijke besmetting: FAVV kan besluiten tot bron-/contactonderzoek. > Humane besmetting: AZG bepaalt beleid voor contactonderzoek.
3. (Chemo)profylaxe	Niet van toepassing.
4. Wering	Niet van toepassing.
Meldingsplichtig	Ja, een meldingsplichtige ziekte aangeven