

Samenvatting richtlijn: Salmonella typhi/Salmonella paratyphi

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	<p><u>Buiktyfus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Kan atypisch beginnen met toenemende koorts, verminderde eetlust, hoofdpijn, malaise, vage buikpijn en sufheid. Vóór de koorts soms diarree in combinatie met obstipatie. Bradycardie, niet productieve hoest, splenomegalie, rode vlekken op de huid. > Kinderen < 2 jaar vaak mild verloop. <p><u>Paratyfus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Milder verloop dan buiktyfus. Gastro-enteritis soms met slijmerige of bloederige diarree. > Soms sepsis. > Verhoogde kans op ernstig beloop bij cellulaire immundeficiëntie.
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> > Kweek van bloed of beenmerg, soms ook uit faeces, roseolen of urine. > PCR op bloed, urine, faeces mogelijk. > NRC: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_lab/salmonella_shigella/default.aspx
Incubatieperiode	<ul style="list-style-type: none"> > Afhankelijk van besmettingsdosis. > Buiktyfus: 3 dagen tot een maand, meestal 8 tot 14 dagen. > Paratyfus: meestal 1 tot 3 weken voor de systemische infectie.
Besmettelijke periode	Tot 2 weken na verdwijnen symptomen. Langdurig dragerschap mogelijk.
Reservoir	<ul style="list-style-type: none"> > De mens. > Bij S. Paratyphi soms ook vee.
Besmettingsweg	<ul style="list-style-type: none"> > Fecaal-oraal (voornamelijk besmet voedsel/water). > Oro-anaal seksueel contact.
Risicogroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Reizigers naar endemische gebieden. > Personen met achloorhydrie, bepaalde darmziekten, immuunsuppressie en hivinfectie hebben een verhoogd risico op infectie.
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	<ul style="list-style-type: none"> > Is zieke recent in buitenland geweest, ingeënt (buiktyfus), evt. meer ziektegevallen binnen reisgezelschap? > Besmet voedsel? > Zieke in omgeving patiënt?
2. Contactopsporing	<p>Contactonderzoek via éénmalige feceskweek wordt aangeraden bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Alle gezins- en daarmee vergelijkbare contacten als indexpatiënt: <ul style="list-style-type: none"> o onvoldoende hygiënebesef heeft o voor de voedselbereiding zorg droeg. > Contacten met klachten. > Contacten werkzaam in voeding of in zorg. > Reisgezelschap indien ≥ 2 gevallen van buiktyfus/paratyfus.
3. (Chemo)profylaxe	Niet van toepassing.
4. Wering	<ul style="list-style-type: none"> > Ja. Tot klinisch herstel indien goede hand- en toilethygiëne. > Bij kinderen < 6 jaar of mensen werkzaam in zorg- of voeding: tot drie feceskweken (3w na stop symptomen en 2w na stop antibiotica) negatief.
Meldingsplichtig	Ja, een meldingsplichtige ziekte aangeven .